

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ



ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΚΟΤΣΑΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΛΛΙΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	ΜΗΝΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΙΜΙΚΑ	ΜΠΙΛΙΡΗ ΘΕΜΕΛΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΖΩΗ	ΜΠΕΝΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ	ΝΕΟΧΩΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ	ΝΤΙΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
	ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS

Ο όρος AIDS αναφέρεται στο τελευταίο στάδιο της **HIV λοίμωξης**, κατά το οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα έχει αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε το άτομο είναι επιρρεπές σε διάφορα νοσήματα και συγκεκριμένους τύπους καρκίνου.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

- Σεξουαλική επαφή (πρωκτική, κολπική, στοματική)
- Αιχμηρά αντικείμενα (ξυραφάκια, βελόνες, σύριγγες)
- Κάθετη μετάδοση από μία HIV οροθετική μητέρα στο νεογνό κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και του θηλασμού.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

- Αντιρετροϊκά φάρμακα.
- Προφύλαξη (χρήση προφυλακτικών).
- Εξετάσεις για Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα.

(προφύλαξη)

**ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΩ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΓΥΡΩ ΜΟΥ**

AIDS ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ-ΤΟΚΕΤΟΥ-ΘΗΛΑΣΜΟΥ

Με την μη παροχή των κατάλληλων μέτρων σε εγκυμονούσα γυναίκα, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί στο έμβρυο/νεογνό, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης/του τοκετού/του θηλασμού. Η **λήψη της θεραπείας** προλαμβάνει την κάθετη μετάδοση του ιού και δίνει την δυνατότητα στις μητέρες να έχουν ασφαλείς κυήσεις και να αποκτήσουν υγιή, αρνητικά ως προς τον HIV νεογνά.



ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΟ AIDS ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΗΛΑΣΜΟ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ;

1. Δυνατότητα λήψης **προφυλακτικής αγωγής**.
2. Εάν η μητέρα θηλάζει, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον γιατρό της σχετικά με τη **συνέχιση ή μη του θηλασμού**.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΣ/ ΝΕΟΓΝΟ ΟΤΑΝ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΛΥΝΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΗΛΑΣΜΟ;

Ο κίνδυνος μόλυνσης κατά τον θηλασμό επηρεάζεται από παράγοντες όπως η **διάρκεια**, η **αποκλειστικότητα** ή **μη** του θηλασμού, η **υγεία του μαστού** και το **ανοσολογικό προφίλ** της μητέρας.

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΜΩΡΟ:

1. Λήψη **αντιρετροϊκών φαρμάκων** κατά τη διάρκεια της κύησης/του τοκετού.
2. Τοκετός με **καισαρική τομή**, αν τα επίπεδα του ιού είναι υψηλά.
3. Χορήγηση **αντιρετροϊκών φαρμάκων στο μωρό** μετά τη γέννηση.
4. **Απαγόρευση θηλασμού**.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ

1. Ζητεί, **διεξάγει** και **ερμηνεύει** ανιχνευτικές εξετάσεις.
2. Παρέχει **συμβουλευτική υποστήριξη** για την κύηση και την θεραπεία του ιού.
3. Παρέχει **φροντίδα** αλλά και **ψυχολογική υποστήριξη** κατά την διάρκεια της κύησης και μέχρι το τέλος της.
4. Παρέχει την **κατάλληλη φροντίδα** στο νεογνό.

AIDS ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι παρεμβάσεις που χρησιμοποιούν οι εργοθεραπευτές για άτομα με **σωματικές** ή **γνωστικές δυσκολίες** μπορούν να εφαρμοστούν σε άτομα που αντιμετωπίζουν λοίμωξη HIV.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα λόγω αυτών των προβλημάτων επηρεάζουν **απλές δραστηριότητες** της καθημερινής ζωής. Οι εργοθεραπευτές είναι σε μια μοναδική θέση να **αντιμετωπίζουν ζητήματα που σχετίζονται με την απόδοση του ατόμου μέσω της πραγματοποίησης ουσιαστικών αλλαγών στο φυσικό περιβάλλον, στο σπίτι και στην εργασία**.

